

## КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ (РЕБРА, ГРУДИНА)

Возможно введение контраста — решение принимает врач.

### Подготовка к исследованию

Специальной подготовки не требуется.

Желательно воздержаться от приема пищи как минимум в течение 4 часов до начала процедуры.

### Если исследование проводится с контрастом

Контраст назначает врач-рентгенолог (КТ).

Если планируется применение йодсодержащего контрастного препарата, то рекомендуется провести дополнительные тесты (анализ крови на креатинин), чтобы исключить наличие острой или хронической почечной и печеночной недостаточности.

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- **Предложения по диете:** можно придерживаться обычной диеты, но в последние 2 часа перед исследованием следует воздержаться от приема пищи.
- **Потребление жидкости:** до и после внутрисосудистого введения контрастного средства следует потреблять адекватное количество жидкости. Особую важность это имеет для больных с множественной миеломой, сахарным диабетом, полиурией, гиперурикемией, а также для грудных детей, маленьких детей и пациентов в преклонном возрасте.
- Если ранее проводились такие обследования как ирригоскопия, пассаж бария по кишечнику, рентгеноскопия желудка, то необходимо будет выждать не менее 7 суток, прежде чем проводить КТ любой из областей тела с контрастным усилением.