

РЕКТОСИГМОКОЛОНОСКОПИЯ/ КОЛОНОСКОПИЯ/ ФИБРОКОЛОНОКОПИЯ/КС/ФКС

Исследование слизистых оболочек прямой, сигмовидной и ободочной кишки.

Подготовка к исследованию

- Если обследование проводится утром (до 12 часов), то последний приём пищи накануне исследования должен состояться накануне (за день до исследования) не позднее 13 часов, т.е. в обед.
- Если процедура назначена на вторую половину дня (после 12 ч), то последний прием пищи должен состояться накануне вечером, не позднее 18 часов.
- **Схема приема пациентом препарата МОВИПРЕП:**

Исследование назначено в интервал 08.00-10.00. Вечером, накануне исследования, между 19 и 20 принять первый литр раствора препарата, в 21.00-22.00 принять второй литр раствора препарата. После каждого выпитого литра препарата, желательно выпить до 500 мл разрешенных напитков (см. ниже).

Исследование назначено в интервал 10.00-14.00. Вечером, накануне исследования между 20 и 21 принять первый литр раствора препарата. В день проведения исследования, в 06.00-07.00 принять второй литр раствора препарата. Также после каждого приема препарата, желательно выпить до 500 мл разрешенных напитков (см.ниже).

Исследование назначено 14.00-19.00. В день колоноскопии, в 8.00-9.00 принять первый литр раствора препарата, в 10.00-11.00 принять второй литр раствора. После каждого выпитого литра препарата, желательно выпить до 500 мл разрешенных напитков (см.ниже).

Препарат принимают дробно по 250 мл каждые 15 минут. Готовить раствор препарата, в соответствии с инструкцией/аннотацией на упаковке.

- **За сутки до исследования** пациенту необходимо принять ЭСПУМИЗАН: 2 капсулы 3 раза в день. Или можно использовать альтернативный препарат ЛАВАКОЛ: содержимое 1 пакета (14 г) растворяют в 200-250 мл кипяченой воды непосредственно перед применением. Раствор следует принимать накануне вечером из расчета каждые 20 мин по 1 разведенному пакету, всего 15 пакетов.
- При любом виде подготовки в день исследования нельзя применять препараты – антикоагулянты (гепарин и его современные аналоги).
- На 3 дня, предшествующие исследованию, назначается бесшлаковая диета.

Разрешено: отварное мясо (кроме колбасных изделий), нежирная рыба, нежирные кисломолочные продукты, яйца, сахар, мед, прозрачные бульоны, чай и кофе без молока, компоты без ягод, вода, безалкогольные неокрашенные напитки.

Запрещено: овощи, фрукты, ягоды, зелень, крупы, орехи, каши, хлеб, окрашенные соки, алкоголь, газированные напитки. Вечером накануне дня исследования — чай.

При любом исследовании под седацией нельзя есть и пить за 3-4 часа до начала исследования.